

Para adultos con psoriasis en placas
de moderada a grave

Emerge Tremfyant®



TREMFYA® es un medicamento con receta que se utiliza para tratar adultos con psoriasis en placas de moderada a grave para quienes la administración de inyecciones o píldoras (terapia sistémica) o fototerapia (tratamiento con luz ultravioleta o UV) puede ser beneficiosa.

En estudios clínicos, 7 de cada 10 pacientes experimentaron un 90 % de aclaramiento de la piel una vez transcurridas 16 semanas. Los pacientes vieron una mejoría en síntomas tales como, el ardor, el escozor y la picazón. Los resultados pueden variar.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE SELECCIONADA

TREMFYA® no está indicado para todas las personas; solo su médico puede decidir si es adecuado para usted. No lo use si es alérgico a TREMFYA®. TREMFYA® es un medicamento con receta que puede causar efectos secundarios complicados, como reacciones alérgicas e infecciones graves. TREMFYA® afecta el sistema inmunológico. Puede aumentar su riesgo de contraer infecciones y disminuir su capacidad para combatirlas. Lea la [Información importante de seguridad en la página 5](#) y la [Guía del medicamento de TREMFYA®](#) para obtener más información sobre este y otros riesgos que conlleva el uso de este medicamento. Hable con su médico si tiene alguna pregunta.

Aprobado por la FDA para adultos con psoriasis en placas de moderada a grave desde 2017

TREMFYA® es el primer medicamento de este tipo aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) que bloquea selectivamente la IL-23.

90% de aclaramiento de la piel

A las 16 semanas

En estudios clínicos, **7 de cada 10 pacientes** experimentaron un **90% de aclaramiento de la piel**.

A las 28 y 48 semanas

En un estudio clínico, casi **9 de cada 10 pacientes** que experimentaron un **90 % de aclaramiento de la piel a las 28 semanas** siguieron viendo dicho aclaramiento del **90 % a las 48 semanas**.

A los 5 años

En un estudio clínico, casi **7 de cada 10 pacientes** que experimentaron un **90 % de aclaramiento de la piel a las 16 semanas** siguieron viendo dicho aclaramiento **a los 5 años**. Al año y en adelante, los pacientes y los proveedores de atención médica sabían que se estaba usando TREMFYA®. Esto puede haber mejorado los resultados. Los resultados pueden variar.

Mejora los síntomas

En estudios clínicos a las 16 semanas, los pacientes evidenciaron mejoras de síntomas tales como los siguientes:



Picazón



Rigidez en la piel



Ardor



Escozor



Dolor

Una piel completamente clara

En un estudio clínico, 5 de cada 10 pacientes experimentaron un aclaramiento completo de la piel o se los clasificó con piel clara a las 16 semanas.

Resultados que puede ver



Paciente real

Semana 0
antes de
TREMFYA®

Semana 16
después
de 3 dosis

Semana 48
después
de 7 dosis

Las fotografías pertenecen a un paciente real con psoriasis en placas de moderada a grave que recibió TREMFYA® 100 mg en las semanas 0 y 4, y luego cada 8 semanas.

Los resultados individuales pueden variar.

TREMFYA® es un medicamento recetado aprobado para adultos con artritis psoriásica activa.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE SELECCIONADA

TREMFYA® no está indicado para todas las personas; solo su médico puede decidir si es adecuado para usted. No lo use si es alérgico a TREMFYA®, TREMFYA® es un medicamento con receta que puede causar efectos secundarios complicados, como reacciones alérgicas e infecciones graves. TREMFYA® afecta el sistema inmunológico. Puede aumentar su riesgo de contraer infecciones y disminuir su capacidad para combatirlos. Lea la [Información importante de seguridad en la página 5](#), y la [Guía del medicamento de TREMFYA®](#) para obtener más información sobre este y otros riesgos que conlleva el uso de este medicamento. Hable con su médico si tiene alguna pregunta.

6 dosis al año después de 2 dosis iniciales*

Primeras 52 semanas de terapia

2 dosis iniciales en las semanas 0 y 4

6 dosis de mantenimiento

1 dosis cada 8 semanas

*TREMFYA® es una inyección de 100 mg que se administra por vía subcutánea en las semanas 0 y 4, y luego cada 8 semanas.

TREMFYA® está indicado para usarse bajo la guía y supervisión de un médico. Los pacientes pueden autoinyectarse después de la capacitación adecuada y la aprobación del médico.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE SELECCIONADA

TREMFYA® no está indicado para todas las personas; solo su médico puede decidir si es adecuado para usted. No lo use si es alérgico a TREMFYA®. TREMFYA® es un medicamento con receta que puede causar efectos secundarios complicados, como reacciones alérgicas e infecciones graves. TREMFYA® afecta el sistema inmunológico. Puede aumentar su riesgo de contraer infecciones y disminuir su capacidad para combatirlos. Lea la [Información importante de seguridad en la página 5](#), y la [Guía del medicamento de TREMFYA®](#) para obtener más información sobre este y otros riesgos que conlleva el uso de este medicamento. Hable con su médico si tiene alguna pregunta.

El inyector One-Press en 3D



No es el tamaño real.

Un **dispositivo de autoinyección controlado por el paciente** que se creó pensando en usted. El dispositivo **One-Press** presenta un diseño **fácil de sostener**. Y, si no es fanático de ver agujas, tiene suerte: One-Press tiene una función de aguja oculta, por lo que no verá la aguja a menos que la busque.



El inyector One-Press controlado por el paciente recibió el sello de Ease of Use (Facilidad de uso) de la Arthritis Foundation después de probarse en pacientes con artritis psoriásica.

Su primera autoinyección debe realizarse en el consultorio del médico para que este pueda mostrarle la forma correcta de administrarse las inyecciones. Después de esta capacitación, y con la aprobación del proveedor de atención médica, podrá inyectarse en casa.

El inyector One-Press tiene un diseño fácil de sujetar que le permite controlar la inyección. Empuje el émbolo hasta el fondo para inyectar la dosis completa de 100 mg.

Lea las **Instrucciones de uso en el bolsillo trasero antes de usar su inyector One-Press de TREMFYA®** y cada vez que renueve la receta.

Escanee o cliquee el código para ver un inyector One-Press en vivo.



1. Apunte la cámara de su teléfono inteligente al marcador para comenzar.
2. Gire y amplíe en el inyector One-Press con los dedos.
3. Toque "See It Live" (Ver en vivo) y vea el inyector One-Press en 3D.

Tremfya withMe

UN PROGRAMA DE SOPORTE A SU MEDIDA

Soporte individualizado durante el tratamiento con TREMFYA®

Nos comprometemos a asegurarnos de que obtenga lo que desee, **cuando lo desee**. El tratamiento va más allá de las citas y las inyecciones. **Pretende brindarle apoyo.**



Guía TREMFYA withMe

Conozca a la Guía TREMFYA withMe, un profesional de atención médica calificado* que lo ayudará durante su tratamiento con el soporte y la información que necesite.

*Las guías no proporcionan asesoría médica. Consulte a su médico sobre cualquier duda que tenga sobre su enfermedad o terapia.



Receta y soporte de costos

Recibirá ayuda para lo siguiente: verificar la cobertura de su seguro, comprender cómo renovar sus recetas y buscar opciones que puedan hacer más económico su tratamiento.



Respaldo para el tratamiento

Tendrá acceso a información sobre su enfermedad, información y capacitación para inyectarse y para cómo devolver de forma segura las jeringas u otros dispositivos de inyección usados. Su médico es la persona más indicada para ayudarlo a entender cuáles pueden ser sus expectativas. Su Guía también está a disposición, después de que haya hablado con su médico, si tiene preguntas sobre las inyecciones.

Conozca más sobre TREMFYA withMe, un programa de apoyo a su medida

Visite tremfyawithme.com para obtener más información.



Escanee este CÓDIGO QR con la cámara de su teléfono.

Si aún no se ha inscrito, **ESCANEE O LLAME AL:**

1-833-WITHME1 (948-4631), de lunes a viernes de 8:00 A. M. a 11:00 P. M., hora del este (ET)

Programa de desecho de agujas Safe Returns®



Si ha obtenido la aprobación de su médico para inyectarse en casa y ha recibido la capacitación adecuada, puede usar Safe Returns® como una forma sencilla, segura y conveniente de desechar las jeringas u otros dispositivos de inyección usados, sin costo alguno para usted. Cuando se registre en TREMfYA.com/safe-returns, recibirá por correo un contenedor plástico para desechos Safe Returns®, junto con instrucciones de devolución por correo fáciles de seguir.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

¿Qué es lo más importante que debo saber sobre TREMFYA®?

TREMFYA® es un medicamento con receta que puede causar efectos secundarios complicados, como los siguientes:

- **Reacciones alérgicas graves.** Deje de usar TREMFYA® y procure atención médica de emergencia de inmediato si desarrolla alguno de los siguientes síntomas de una reacción alérgica grave:
 - desmayos, mareos, sensación de desvanecimiento (presión arterial baja)
 - hinchazón de la cara, los párpados, los labios, la boca, la lengua o la garganta
 - respiración dificultosa u opresión en la garganta
 - opresión en el pecho
 - erupción cutánea, urticaria
 - picazón
- **Infecciones.** TREMFYA® puede disminuir la capacidad del sistema inmunológico para combatir infecciones y puede aumentar el riesgo de contraerlas. El proveedor de atención médica deberá realizarle exámenes para detectar infecciones y tuberculosis (TB) antes de comenzar el tratamiento con TREMFYA® y es posible que deba tratar la TB antes de comenzar el tratamiento con TREMFYA® si usted tiene antecedentes de esta afección o la enfermedad activa. El proveedor de atención médica deberá realizarle controles exhaustivos para detectar la posible presencia de signos y síntomas de TB durante y después del tratamiento con TREMFYA®.

Comuníquese de inmediato al proveedor de atención médica si presenta una infección o tiene síntomas de esta, entre los que se incluyen:

- fiebre, sudoración o escalofríos
- dolores musculares
- pérdida de peso
- tos
- calor, enrojecimiento o dolor en la piel o llagas en el cuerpo diferentes a las producidas por la psoriasis
- diarrea o dolor de estómago
- falta de aire
- esputo (mucosidad) con sangre
- ardor al orinar o micción con más frecuencia de lo normal

No se inyecte TREMFYA® si ha tenido una reacción alérgica grave a guselkumab o cualquiera de los ingredientes de TREMFYA®.

Antes de utilizar TREMFYA®, bríndele información al proveedor de atención médica sobre todas las enfermedades que padece, incluso si usted presenta alguna de estas condiciones:

- padece algunas de las afecciones o los síntomas especificados en la sección **“¿Qué es lo más importante que debo saber sobre TREMFYA®?”**.

- padece una infección que no desaparece o siempre reaparece.
- tiene tuberculosis o estuvo cerca de alguien que tiene esta enfermedad.
- recibió recientemente o tiene previsto recibir una inmunización (vacuna). Debe evitar la administración de vacunas atenuadas durante el tratamiento con TREMFYA®.
- está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si TREMFYA® puede afectar al bebé nonato.
- está amamantando o tiene previsto hacerlo. Se desconoce si TREMFYA® pasa a través de la leche materna.

Informe al proveedor de atención médica acerca de todos los medicamentos que toma, incluidos aquellos con receta y de venta libre, vitaminas y suplementos naturales.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de TREMFYA®? TREMFYA® puede provocar efectos secundarios graves. Consulte “¿Qué es lo más importante que debo saber sobre TREMFYA®?”.

Entre los efectos secundarios más frecuentes de TREMFYA® se incluyen los siguientes:

infecciones en el tracto respiratorio superior, dolor de cabeza, reacciones en el lugar de la inyección, dolor articular (artralgia), diarrea, gripe estomacal (gastroenteritis), infecciones por hongos de la piel e infecciones por herpes simple y bronquitis.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de TREMFYA®. Comuníquese con su médico para que le brinde asesoría médica acerca de los efectos secundarios.

Utilice TREMFYA® exactamente como le indicó el proveedor de atención médica.

Lea la [información completa de prescripción](#), la [Guía del medicamento para TREMFYA®](#), y hable con su médico si tiene alguna pregunta.

Se lo alienta a que informe los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados a la FDA. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

 **Tremfya**[®]
(guselkumab)



7 de cada 10 pacientes experimentaron un 90 % de aclaramiento de la piel una vez transcurridas 16 semanas. Los pacientes vieron una mejoría en síntomas tales como, el ardor, el escozor y la picazón. Los resultados pueden variar.

Descubra más sobre TREMFYA[®]

Para psoriasis en placas de moderada a grave

Haga clic aquí para leer la [Información de prescripción](#), la [Guía del medicamento](#) y las [Instrucciones de uso](#).

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE SELECCIONADA

TREMFYA[®] no está indicado para todas las personas; solo su médico puede decidir si es adecuado para usted. No lo use si es alérgico a TREMFYA[®]. TREMFYA[®] es un medicamento con receta que puede causar efectos secundarios complicados, como reacciones alérgicas e infecciones graves. TREMFYA[®] afecta el sistema inmunológico. Puede aumentar su riesgo de contraer infecciones y disminuir su capacidad para combatirlos. Lea la [Información importante de seguridad en la página 5](#), y la [Guía del medicamento de TREMFYA[®]](#) para obtener más información sobre este y otros riesgos que conlleva el uso de este medicamento. Hable con su médico si tiene alguna pregunta.



Comience con una conversación honesta

Hablar sin reservas sobre uno mismo puede ser difícil. Es por eso que queremos ayudarlo a **tener una conversación más audaz con su médico**. No olvide que usted y él tienen el mismo objetivo. Observe a Kate y Joe tener una conversación honesta sobre su psoriasis en placas de moderada a grave.



Visite TREMFYA.com/straighttalk para conocer más sobre Joe y leer historias de otros pacientes.

" Han pasado cuatro años y sigo teniendo la piel más clara,* ya ni siquiera hablo al respecto. "

- Joe,
paciente que
emplea TREMFYA®
*Los resultados individuales
pueden variar.*



**En un estudio clínico, casi 7 de cada 10 pacientes que experimentaron un 90 % de aclaramiento de la piel a las 16 semanas siguieron viendo dicho aclaramiento a los 5 años. Al año y en adelante, los pacientes y los proveedores de atención médica sabían que se estaba usando TREMFYA®. Esto puede haber mejorado los resultados. Los resultados pueden variar.*

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE SELECCIONADA

TREMFYA® no está indicado para todas las personas; solo su médico puede decidir si es adecuado para usted. No lo use si es alérgico a TREMFYA®. TREMFYA® es un medicamento con receta que puede causar efectos secundarios complicados, como reacciones alérgicas e infecciones graves. TREMFYA® afecta el sistema inmunológico. Puede aumentar su riesgo de contraer infecciones y disminuir su capacidad para combatirlas. Lea la [Información importante de seguridad en la página 5](#), y la [Guía del medicamento de TREMFYA®](#) para obtener más información sobre este y otros riesgos que conlleva el uso de este medicamento. Hable con su médico si tiene alguna pregunta.